

Test af ~

Tilde (~) efter en funktion i Maple bevirker, at funktionen anvendes på alle listens elementer!

> restart

Kvadrere:

> $f := x \rightarrow x^2$

$$f := x \rightarrow x^2 \quad (1)$$

Trække 1 fra:

> $g := x \rightarrow x - 1$

$$g := x \rightarrow x - 1 \quad (2)$$

Vektor

> $V := \langle 1, 2, 3 \rangle$

$$V := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Kvadrere alle koordinater i en vektor:

> $f \sim (V)$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

Trække 1 fra alle koordinater i en vektor:

> $g \sim (V)$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

> $Vx := \langle x, 1 - x^2, \sin(x) \rangle$

$$Vx := \begin{bmatrix} x \\ 1 - x^2 \\ \sin(x) \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

Differentiere alle koordinater i en vektor efter x:

> $\text{diff} \sim (Vx, x)$

$$(1.5)$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2x \\ \cos(x) \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

Liste

$$\begin{aligned} > L := [4, 5, 6] \\ L := [4, 5, 6] \end{aligned} \quad (2.1)$$

Kvadrere alle elementer i en liste:

$$\begin{aligned} > f\sim(L) \\ [16, 25, 36] \end{aligned} \quad (2.2)$$

Trække 1 fra alle elementer i listen:

$$\begin{aligned} > g\sim(L) \\ [3, 4, 5] \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$> Lx := [e^x, \ln(x), \sqrt{x}]$$

$$Lx := [e^x, \ln(x), \sqrt{x}] \quad (2.4)$$

Differentiere alle elementer i en liste efter x:

$$\begin{aligned} > diff\sim(Lx, x) \\ \left[e^x, \frac{1}{x}, \frac{1}{2\sqrt{x}} \right] \end{aligned} \quad (2.5)$$

Matrix

$$> M := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Kvadrere alle elementer i en matrix:

$$\begin{aligned} > f\sim(M) \\ \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 16 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Trække 1 fra alle elementer i matricen:

$$\begin{aligned} > g\sim(M) \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$> Mx := \begin{bmatrix} x^2 & 2 \cdot x - 1 \\ \cos(x) & \tan(x) \end{bmatrix}$$

(3.4)

$$Mx := \begin{bmatrix} x^2 & 2x - 1 \\ \cos(x) & \tan(x) \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Differentiere alle elementer i en matrix efter x:

> *diff~*(Mx, x)

$$\begin{bmatrix} 2x & 2 \\ -\sin(x) & 1 + \tan(x)^2 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$