

Analytisk funktion

En C^∞ -funktion, hvis Taylor-række konvergerer imod funktionen i en omegn af punktet x_0 , siges at være en **analytisk funktion**.

Læs nærmere: http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_function

Ikke alle funktion, som kan differentieres uendelig mange gange, er analytiske!

Modeksempel:

Definer følgende funktion:


$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{for } x > 0 \end{cases}$$

Denne funktion $f \in C^\infty$, men er IKKE en analytisk funktion, da Taylor-rækken ud fra ud fra $x_0 = 0$ er identisk med 0!

> restart

> $f(x) := \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & x > 0 \end{cases} :$

> plot($f(x)$, $x=-3..3$, color = blue, thickness = 2, gridlines)




```
> f(0.1)
```

3.720075976 10⁻⁴⁴

(1)

```
> plot(f(x), x=0..0.1, y=0..10-43, color=blue, thickness=2, gridlines)
```



Funktionen er så flad i $x_0 = 0$, at alle afledede i dette punkt er 0!

Derfor er Taylorrækken ud fra $x_0 = 0$ identisk med nulpolynomiet.

Det betyder, at Taylorrækken ud fra $x_0 = 0$ ALDRIG konvergerer imod $f(x)$ for noget $x > 0$.

$$> \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x))$$

0

(2)

Dvs. $f(0) = 0$, og f er kontinuert i 0.

$$> f_1 := \text{unapply}\left(\frac{d}{dx} f(x), x\right)$$

$$f_1 := x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{2e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3} & 0 < x \end{cases}$$

(3)

$$> \lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x))$$

0

(4)

Dvs. $f'(0) = 0$, og f' er kontinuert i 0.

> $f_2 := \text{unapply}\left(\frac{d}{dx} f_1(x), x\right)$

$$f_2 := x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ -\frac{6e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^4} + \frac{4e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^6} & 0 < x \end{cases} \quad (5)$$

> $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x))$

0 (6)

> $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f_1(x) - 0}{x - 0}\right)$

0 (7)

Dvs. $f''(0) = 0$, og f'' er kontinuert i 0.

osv. osv.

> **for** n **from** 2 **by** 1 **to** 10 **do** $f_{n+1} := \text{unapply}\left(\frac{d}{dx} f_n(x), x\right)$ **end do**

$$f_3 := x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{24e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^5} - \frac{36e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^7} + \frac{8e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^9} & 0 < x \end{cases}$$

$$f_4 := x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ -\frac{120e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^6} + \frac{300e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^8} - \frac{144e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{10}} + \frac{16e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{12}} & 0 < x \end{cases}$$

$$f_5 := x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{720e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^7} - \frac{2640e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^9} + \frac{2040e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{11}} - \frac{480e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{13}} + \frac{32e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{15}} & 0 < x \end{cases}$$

$$f_6 := x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ -\frac{5040e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^8} + \frac{25200e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{10}} - \frac{27720e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{12}} + \frac{10320e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{14}} - \frac{1440e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{16}} + \frac{64e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{18}} & 0 < x \end{cases}$$

$$f_7 := x \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \frac{40320 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^9} - \frac{262080 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{11}} + \frac{383040 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{13}} - \frac{199920 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{15}} + \frac{43680 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{17}} - \frac{4032 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{19}} \end{array} \right.$$

$$f_8 := x \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -\frac{362880 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{10}} + \frac{2963520 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{12}} - \frac{5503680 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{14}} + \frac{3764880 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{16}} - \frac{1142400 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{18}} + \dots \end{array} \right.$$

$$f_9 := x \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \frac{3628800 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{11}} - \frac{36288000 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{13}} + \frac{82978560 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{15}} - \frac{71245440 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{17}} + \frac{28092960 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{19}} \end{array} \right.$$

$$f_{10} := x \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -\frac{39916800 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{12}} + \frac{479001600 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{14}} - \frac{1317254400 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{16}} + \frac{1377129600 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{18}} - \frac{67622400 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{20}} \end{array} \right.$$

$$f_{11} := x \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \frac{479001600 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{13}} - \frac{6785856000 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{15}} + \frac{22034073600 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{17}} - \frac{27422841600 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{19}} + \frac{1600000000 e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{21}} \end{array} \right.$$

> for n from 2 by 1 to 10 do $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_{n+1}(x))$ end do

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(9)

> for n from 2 by 1 to 10 do $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f_n(x) - 0}{x - 0} \right)$ end do

0
0



0
0
0
0
0
0
0

(10)