

En funktion, hvor Taylor-polynomiet kun passer på et vist område

I dette eksempel ser man, at **konvergens-radius** r for Taylor-polynomiet kan være endelig.

Det betyder, at uanset, hvor mange grader man tager med i Taylor-polynomiet, så passer den kun i intervallet $]x_0 - r, x_0 + r[$

Test påstanden ved at prøve med forskellige værdier af udviklingspunktet x_0 og graden n .

```
> restart
```

```
> f(x) :=  $\frac{1}{1+x^2}$ 
```

$$f := x \mapsto \frac{1}{x^2 + 1} \quad (1)$$

```
> x0 := 0
```

$$x_0 := 0 \quad (2)$$

```
> n := 5
```

$$n := 5 \quad (3)$$


```
> g(x) := mtaylor(f(x), x=x0, n) :
```

```
> with(plots) :
```

```
plot1 := plot(f(x), x=-5..5, color=red) :
```

```
plot2 := plot(g(x), x=-5..5, color=blue) :
```

```
display(plot1, plot2, view=[-5..5, -2..2])
```



Forklaring

Funktionen $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ er veldefineret for alle $x \in \mathbb{R}$,


Men funktionen har indenfor de komplekse tal faktisk 2 nulpunkter i nævneren:

> `solve(1 + x2 = 0)`

$I, -I$

(1.1)

> `complexplot(['%'], view = [-2 .. 2, -2 .. 2], style = point, symbol = solidcircle, symbolsize = 20, labels = [reelle akse, imaginære akse])`



Nævneren i funktionen $f(x)$ har altså 2 komplekse rødder: I og $-I$.

Vi antager, at x_0 ligger på den reelle akse.

Og finder så afstanden mellem x_0 og de 2 rødder:

$$> \text{Konvergensradius1} := \text{abs}(x_0 - I)$$

$$\text{Konvergensradius1} := 1$$

(1.2)

$$> \text{Konvergensradius2} := \text{abs}(x_0 + I)$$

$$\text{Konvergensradius2} := 1$$

(1.3)

$$> \text{Konvergensradius3} := \sqrt{x_0^2 + 1}$$

$$\text{Konvergensradius3} := 1$$

(1.4)

Her gælder, at hvis udviklingspunktet hedder x_0 , så er konvergensradius $r = \sqrt{x_0^2 + 1}$

Det er jo faktisk bare Pythagoras' sætning!

Passer det men dine forsøg ovenfor?