

## Effektiv Maple løsning af 2. ordens differentiaalligning (eNote 18)

### Tilfældet med 2 komplekst konjugerede egenverdier

Opgave 1A, uge 13, StoreDag

Givet den homogene differentiaalligning

A

$$x''(t) + 2x'(t) + 5x(t) = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Find den fuldstændige løsning.

restart

Karakterligningen:  $\lambda^2 + 2 \cdot \lambda + 5 = 0$

$\text{solve}(\lambda^2 + 2 \cdot \lambda + 5 = 0, \lambda) = -1 + 2 I, -1 - 2 I$

Dvs. 2 komplekst konjugerede rødder.

$\lambda_1 := \%[1] = -1 + 2 I$

### Den fuldstændige reelle løsning

$x := \text{unapply}(\text{evalc}(c_1 \cdot \text{Re}(e^{\lambda_1 \cdot t}) + c_2 \cdot \text{Im}(e^{\lambda_1 \cdot t})), t) :$

$x(t) = c_1 e^{-t} \cos(2t) + c_2 e^{-t} \sin(2t)$

**Konklusion:**  $x(t) = (c_1 \cdot \cos(2 \cdot t) + c_2 \cdot \sin(2 \cdot t)) \cdot e^{-t}$  hvor  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

### Betinget reel løsning

Som opfylder:  $x(0) = 1$  og  $x'(0) = 2$ .

$L := \text{solve}(\{x(0) = 1, x'(0) = 2\}) = \left\{ c_1 = 1, c_2 = \frac{3}{2} \right\}$

$\text{subs}(L[1], L[2], x(t)) = e^{-t} \cos(2t) + \frac{3 e^{-t} \sin(2t)}{2}$

**Konklusion:**  $x(t) = \left( \cos(2 \cdot t) + \frac{3}{2} \cdot \sin(2 \cdot t) \right) \cdot e^{-t}$