

Eksempel på funktion af 2 variable, hvor rækkefølgen af differentiation efter x hhv. y IKKE giver det samme ved ombytning.

$$f(x, y) = \begin{cases} x \cdot y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{for } x \neq 0 \wedge y \neq 0 \\ 0 & \text{for } x = 0 \wedge y = 0 \end{cases}$$

Eksemplet er hentet fra bogen "Counterexamples in Analysis":

http://books.google.com/books?id=cDAMh5n4lkC&printsec=frontcover&hl=da&source=gbz_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false

> restart

1. ordens afledeede:

$\frac{\partial f}{\partial x}$ beregnes (pånær i (0, 0)) :

$$\begin{aligned} > \text{diff}\left(x \cdot y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, x\right) \\ & \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2 y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned} \quad (1)$$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y)$ beregnes (pånær i (0, 0)) :

$$\begin{aligned} > \text{subs}(x=0, (1)) \\ & -y \end{aligned} \quad (2)$$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)=0$, da $|f(x, y) - f(0, 0)| \leq |x| \cdot |y|$

$\frac{\partial f}{\partial y}$ beregnes (pånær i (0, 0)) :

$$\begin{aligned} > \text{diff}\left(x \cdot y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, y\right) \\ & \frac{x(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} - \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} - \frac{2xy^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned} \quad (3)$$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)$ beregnes (pånær i (0, 0)) :

$$\begin{aligned} > \text{subs}(y=0, (3)) \\ & x \end{aligned} \quad (4)$$

$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)=0$, da $|f(x, y) - f(0, 0)| \leq |x| \cdot |y|$

2. ordens afledeede:

Beregning af $\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(0, 0)$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y} \right)$$

➤ $\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{(2)-0}{y} \right)$

— 1

(5)

Dvs. $\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(0, 0) = -1$

Beregning af $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(0, 0) :$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} \right)$$

➤ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(4)-0}{x} \right)$

1

Dvs. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(0, 0) = 1$

Altså er $\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(0, 0)$

■

(6)