

2. ordens differentiaalligninger med konstante koefficienter

Generel algoritme til bestemmelse af en partikulær løsning, når højre siden er et polynomium

Opgave 3A, Uge 13, StoreDag

Betragt den lineære afbildning $f : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ givet ved

$$f(x(t)) = x''(t) + 3x'(t) - 4x(t).$$

Gæt en partikulær løsning til den inhomogene differentiaalligning

A

$$f(x(t)) = 29 - 12t$$

og opstil derefter den fuldstændige løsning til ligningen.

$$f(X) := \text{diff}(X, t, t) + 3 \cdot \text{diff}(X, t) - 4 \cdot X:$$

$$f(x(t)) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) + 3 \frac{d}{dt} x(t) - 4x(t)$$

$$f(\cos(t)) = -5 \cos(t) - 3 \sin(t)$$

$$\text{dsolve}(f(x(t)) = 0) = x(t) = _C1 e^{-4t} + _C2 e^t$$

Simuleret håndregning, når højre side er $29 - 12 \cdot t$

restart

$$f(X) := \text{diff}(X, t, t) + 3 \cdot \text{diff}(X, t) - 4 \cdot X:$$

$$HS := 29 - 12 \cdot t = 29 - 12 t$$

$$G\text{Æ}T := a \cdot t + b:$$

$$V\text{S} := f(G\text{Æ}T) = -4 a t + 3 a - 4 b$$

$$L := \text{solve}(\{-4 \cdot a = -12, 3 \cdot a - 4 \cdot b = 29\}) = \{a = 3, b = -5\}$$

$$a := \text{rhs}(L[1]) : b := \text{rhs}(L[2]) :$$

$$G\text{Æ}T = 3 t - 5$$

$$\text{Inhomogen partikulær løsning: } \underline{\underline{x(t) = 3 \cdot t - 5}}$$

Maple tjek:

$$\text{dsolve}(f(x(t)) = HS) = x(t) = e^t _C2 + e^{-4t} _C1 + 3 t - 5$$

Generel algoritme, når den inhomogene del er et polynomium

Herunder vises, hvordan man kan programmere en generel algoritme i Maple, som finder den partikulære løsning!

Følger metode 18.6 i eNote 18.

||| Metode 18.6 Polynomium

Givet den inhomogene differentiaalligning

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_0x(t) = q(t), \quad t \in I, \quad (18-32)$$

hvor q er et n -te gradspolynomium. Hvis $a_0 \neq 0$ findes der et polynomium af grad n som er en partikulær løsning til differentiaalligningen. Generelt findes der et polynomium af grad højst $n + 2$ som er en partikulær løsning til differentiaalligningen. Man finder partikulære løsninger på de nævnte former ved at indsætte polynomier af passende grad med ubekendte koefficienter i differentiaalligningens venstreside og afstemme med q , jf. identitetssætningen for polynomier, eNote 2, sætning 2.15.

Årsagen til at man må prøve med et polynomium, som er 2 grader højere end højresidens polynomium er, at 2. ordens differentiaalligningens venstre side kan resultere i et polynomium, som er op til 2 grader lavere. Hvis $a_0 = 0$, så bliver resultatet 1 grad lavere. Hvis både $a_0 = 0$ og $a_1 = 0$, så bliver resultatet 2 grader lavere.

Brugeren skal indtaste de 2 næste linjer (markeret med **rødt**), nemlig venstre side af differentiaalligningen ($f(X)$) og højre side af differentiaalligningen (HS).

restart

Indtast (afhænger af opgaveteksten)

Indskriv venstre side af differentiaalligningen (som en funktion):

$$f(X) := \text{diff}(X, t, t) + 3 \cdot \text{diff}(X, t) - 4 \cdot X:$$

Højre siden (den inhomogene del) indskrives, så kører resten automatisk:

$$HS := 29 - 12 \cdot t:$$

Her kører den generelle algoritme

Graden af højre siden +2:

$$n := \text{degree}(HS) + 2 = 3$$

Generel polynomium af grad 2 højere end højresiden opbygges:

$$G\mathcal{A}E\mathcal{T} := 0:$$

for i **from** 0 **to** n **do**

$$G\mathcal{A}E\mathcal{T} := G\mathcal{A}E\mathcal{T} + c[i] \cdot t^i:$$

od:

$$G\mathcal{A}E\mathcal{T} = c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$$

Gættet indsættes i venstre siden og omstruktureres efter potenser af t :

$$VS := f(G\mathcal{A}ET) = -4t^3 c_3 - 4t^2 c_2 + 9t^2 c_3 - 4t c_1 + 6t c_2 + 6t c_3 - 4c_0 + 3c_1 + 2c_2$$

$$VS := collect(VS, t) = -4c_3 t^3 + (-4c_2 + 9c_3) t^2 + (-4c_1 + 6c_2 + 6c_3) t - 4c_0 + 3c_1 + 2c_2$$

Koefficienterne i de 2 polynomier skal være ens. Det giver løsningen på koefficienterne:

$$L := solve(\{seq(coeff(VS, t, i) = coeff(HS, t, i), i = 0 .. n)\}, \{seq(c[i], i = 0 .. n)\})$$

$$\{c_0 = -5, c_1 = 3, c_2 = 0, c_3 = 0\}$$

Nu opbygges løsningen, som et er polynomium:

$$L\mathcal{O}SN := 0 :$$

for i from 0 to n do

$$c[i] := rhs(L[i + 1]) :$$

$$L\mathcal{O}SN := L\mathcal{O}SN + c[i] \cdot t^i :$$

od:

En inhomogen partikulær løsning er så:

$$L\mathcal{O}SN = -5 + 3t$$

Maple tjek:

$$dsolve(f(x(t)) = HS) = x(t) = e^t _C2 + e^{-4t} _C1 - 5 + 3t$$

Kæmpe eksempel med den generelle algoritme: $29 - 2 \cdot t + t^2 - 2 \cdot t^3 + t^7$

restart

Indskriv venstre side af differentialligningen (som en funktion):

$$f(X) := diff(X, t, t) + 3 \cdot diff(X, t) - 4 \cdot X :$$

Højre siden (den inhomogene del) indskrives, så kører resten automatisk:

$$HS := 29 - 2 \cdot t + t^2 - 2 \cdot t^3 + t^7 :$$

Graden af højre siden er:

$$n := degree(HS) + 2 = 9$$

Generel polynomium af grad 2 højere end højresiden opbygges:

$$G\mathcal{A}ET := 0 :$$

for i from 0 to n do

$$G\mathcal{A}ET := G\mathcal{A}ET + c[i] \cdot t^i :$$

od:

$$G\mathcal{A}ET = c_9 t^9 + c_8 t^8 + c_7 t^7 + c_6 t^6 + c_5 t^5 + c_4 t^4 + c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$$

Gættet indsættes i venstre siden og omstruktureres efter potensen af t:

$$VS := f(G\mathcal{A}ET) =$$

$$\begin{aligned} & -4t^9 c_9 - 4t^8 c_8 + 27t^8 c_9 - 4t^7 c_7 + 24t^7 c_8 + 72t^7 c_9 - 4t^6 c_6 + 21t^6 c_7 + 56t^6 c_8 - 4t^5 c_5 + 18t^5 c_6 \\ & + 42t^5 c_7 - 4t^4 c_4 + 15t^4 c_5 + 30t^4 c_6 - 4t^3 c_3 + 12t^3 c_4 + 20t^3 c_5 - 4t^2 c_2 + 9t^2 c_3 + 12t^2 c_4 - 4t c_1 \\ & + 6t c_2 + 6t c_3 - 4c_0 + 3c_1 + 2c_2 \end{aligned}$$

$$VS := collect(VS, t) =$$

$$\begin{aligned} & -4c_9 t^9 + (-4c_8 + 27c_9) t^8 + (-4c_7 + 24c_8 + 72c_9) t^7 + (-4c_6 + 21c_7 + 56c_8) t^6 + (-4c_5 + 18c_6 \\ & + 42c_7) t^5 + (-4c_4 + 15c_5 + 30c_6) t^4 + (-4c_3 + 12c_4 + 20c_5) t^3 + (-4c_2 + 9c_3 + 12c_4) t^2 + \\ & (-4c_1 + 6c_2 + 6c_3) t - 4c_0 + 3c_1 + 2c_2 \end{aligned}$$

Koefficienterne i de 2 polynomier skal være ens. Det giver løsningen på koefficienterne:

$$L := solve(\{seq(coeff(VS, t, i) = coeff(HS, t, i), i = 0 .. n)\}, \{seq(c[i], i = 0 .. n)\})$$

$$\left\{ c_0 = -\frac{4148737}{4096}, c_1 = -\frac{1029631}{1024}, c_2 = -\frac{257537}{512}, c_3 = -\frac{21461}{128}, c_4 = -\frac{5355}{128}, c_5 = -\frac{273}{32}, c_6 = -\frac{21}{16}, c_7 \right.$$

$$= -\frac{1}{4}, c_8 = 0, c_9 = 0 \}$$

Nu opbygges løsningen, som et er polynomium:

$L\text{ØSN} := 0 :$

for i from 0 to n do

$c[i] := rhs(L[i + 1]) :$

$L\text{ØSN} := L\text{ØSN} + c[i] \cdot t^i :$

od:

En inhomogen partikulær løsning er så:

$$L\text{ØSN} = -\frac{4148737}{4096} - \frac{1029631}{1024} t - \frac{257537}{512} t^2 - \frac{21461}{128} t^3 - \frac{5355}{128} t^4 - \frac{273}{32} t^5 - \frac{21}{16} t^6 - \frac{1}{4} t^7$$

Maple tjek:

$dsolve(f(x(t)) = HS) =$

$$x(t) = e^t _C2 + e^{-4t} _C1 - \frac{4148737}{4096} - \frac{1029631}{1024} t - \frac{257537}{512} t^2 - \frac{21461}{128} t^3 - \frac{5355}{128} t^4 - \frac{273}{32} t^5 - \frac{21}{16} t^6 - \frac{t^7}{4}$$

Eksempel hvor det faktisk er nødvendigt at gå 2 grader over højresiden

restart

Indskriv venstre side af differentialligningen (som en funktion):

$f(X) := diff(X, t, t) :$

Højre siden (den inhomogene del) indskrives, så kører resten automatisk:

$HS := 29 - 2 \cdot t + t^2 - 2 \cdot t^3 + t^7 :$

Graden af højre siden er:

$n := degree(HS) + 2 = 9$

Generel polynomium af grad 2 højere end højresiden opbygges:

$G\text{ÆT} := 0 :$

for i from 0 to n do

$G\text{ÆT} := G\text{ÆT} + c[i] \cdot t^i :$

od:

$G\text{ÆT} = c_9 t^9 + c_8 t^8 + c_7 t^7 + c_6 t^6 + c_5 t^5 + c_4 t^4 + c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$

Gættet indsættes i venstre siden og omstruktureres efter potensen af t:

$VS := f(G\text{ÆT}) = 72 t^7 c_9 + 56 t^6 c_8 + 42 t^5 c_7 + 30 t^4 c_6 + 20 t^3 c_5 + 12 t^2 c_4 + 6 t c_3 + 2 c_2$

$VS := collect(VS, t) = 72 t^7 c_9 + 56 t^6 c_8 + 42 t^5 c_7 + 30 t^4 c_6 + 20 t^3 c_5 + 12 t^2 c_4 + 6 t c_3 + 2 c_2$

Koefficienterne i de 2 polynomier skal være ens. Det giver løsningen på koefficienterne:

$L := solve(\{seq(coeff(VS, t, i) = coeff(HS, t, i), i = 0..n)\}, \{seq(c[i], i = 0..n)\}) =$
 $\left\{ c_0 = c_0, c_1 = c_1, c_2 = \frac{29}{2}, c_3 = -\frac{1}{3}, c_4 = \frac{1}{12}, c_5 = -\frac{1}{10}, c_6 = 0, c_7 = 0, c_8 = 0, c_9 = \frac{1}{72} \right\}$

NB: der sket det her, at den homogene løsning $c_1 \cdot t + c_0$ faktisk kommer med her.

Nu opbygges løsningen, som et er polynomium:

$L\text{ØSN} := 0 :$

for i from 0 to n do

$c[i] := rhs(L[i + 1]) :$

$$L\text{ØSN} := L\text{ØSN} + c[i] \cdot t^i :$$

od:

En inhomogen partikulær løsning er så:

$$L\text{ØSN} = c_1 t + c_0 + \frac{29}{2} t^2 - \frac{1}{3} t^3 + \frac{1}{12} t^4 - \frac{1}{10} t^5 + \frac{1}{72} t^9$$

For at få én partikulær løsning må man stryge $c_1 \cdot t + c_0$ (som jo her er løsningen til den homogene differentialligning)!

Maple tjek:

$$dsolve(f(x(t)) = HS) = x(t) = \frac{1}{72} t^9 - \frac{1}{10} t^5 + \frac{1}{12} t^4 - \frac{1}{3} t^3 + \frac{29}{2} t^2 + _C1 t + _C2$$